

Hora	Clínico	Observaciones

Aclaraciones sobre la escala de Glasgow de valoración del dolor

A. Observación del perro en la jaula

Esta parte se debe realizar sin interferir con el animal, para observar el comportamiento espontáneo y no el inducido.

(a) Vocalización

0. Callado: sin vocaliza r.
1. llora/lloriquea: vocalizaciones de leve a moderadas e intermitentes.
2. Gime: vocalizaciones de moderadas a intensas e intermitentes.
3. Chilla/aúlla: vocalizaciones de moderadas a intensas y continuas.

(b) Comportamiento

0. Contento: activo, alegre, vital
1. Tranquilo: es capaz de descansar.
2. Indiferente/no responde al ambiente: sin llamarle la atención el animal no responde a lo que pasa a su alrededor.
3. Nervioso o ansioso: el animal presenta sobreexcitación, es incapaz de descansar.
4. Deprimido/no responde a estímulos: aun llamándole la atención (llamándole, haciendo ruidos, etc) el animal no responde a lo que pasa a su alrededor.

Observación del perro de pie (no aplicable en traumatologías)

(c) Posición y actividad

0. Cómodo: está tranquilo, alegre, o descansa.
1. Inquieto: está intranquilo, desasogado, ligeramente nervioso, muy atento a su alrededor.
2. Molesto/incómodo: está a disgusto, agobiado, nervioso, perturbado, fastidiado.
3. Encorvado: situación de tensión representada con esta postura.
4. Tenso: no puede relajarse, con los músculos rígidos, excesivamente alerta.

(d) Atención a la herida

0. Ignora la zona operada.
1. Mira la zona operada.
2. Lame la zona operada: *pasa la lengua con suavidad por la zona de la herida.*
3. Frota la zona operada: *pasa la lengua con insistencia e intensidad por la zona de la herida, o bien, pasar la zona de la herida contra algún objeto externo o parte del cuerpo.*
4. Mordisquea la zona operada: *picar la herida con los dientes de forma breve y repetitiva.*

C. Presión con suavidad alrededor de la herida

Cuando decimos con suavidad, es por favor con suavidad: al animal/e duele, además, si presionamos de forma muy brusca, podemos asustarle, provocando una respuesta falsamente aumentada. El modo correcto es presionar suavemente y acercándose progresivamente a la zona de la herida, para incrementar la intensidad de la presión.

(e) Reacción a la palpación

0. No hace nada
1. Mira a la herida
2. Se encoge o pone mueca de dolor
3. Grune o marca la zona: saca los dientes.
4. Amenaza: intenta morde r.
5. llora

(f) Movilidad

0. Normal
1. Cojea
2. Le cuesta caminar o camina lento
3. Rígido
4. Se niega a caminar